



# Statut des espèces d'orchidées du Languedoc et de l'Aveyron

SFO Languedoc

date de la mise à jour :

13-déc.-09

Classement par espèces

| Noms latins                                           | Noms français                    | Classe de responsabilité régionale | Liste rouge Languedoc | Liste rouge France | Proportion de la population française | Niveau de protection légale |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i> | Orchis punaise                   | N+                                 | LC                    | VU                 | 20-50%                                | nationale                   |
| <i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i>   | Orchis parfumé                   | N+                                 | LC                    | NT                 | 10-25%                                |                             |
| <i>Anacamptis laxiflora</i>                           | Orchis à fleurs lâches           | L-                                 | NT                    | VU                 | 0,5-2%                                |                             |
| <i>Anacamptis longicornu</i>                          | Orchis à long éperon             | CC                                 | RE                    | VU                 |                                       | nationale                   |
| <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i>           | Orchis bouffon                   | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>picta</i>           | Orchis peint                     | L-                                 | NT                    | LC                 | 2-4%                                  |                             |
| <i>Anacamptis palustris</i>                           | Orchis des marais                | L+                                 | VU                    | VU                 | 5-15%                                 |                             |
| <i>Anacamptis papilionacea</i>                        | Orchis papillon                  | L+                                 | VU                    | NT                 | 2-8%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i>                         | Orchis pyramidal                 | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-5%                                  |                             |
| <i>Cephalanthera damasonium</i>                       | Céphalanthère à grandes fleurs   | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-5%                                  |                             |
| <i>Cephalanthera longifolia</i>                       | Céphalanthère à longues feuilles | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,5-2%                                | régionale (MP)              |
| <i>Cephalanthera rubra</i>                            | Céphalanthère rouge              | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,5-2%                                |                             |
| <i>Coeloglossum viride</i>                            | Orchis grenouille                | N-                                 | LC                    | NT                 | 0,1-1%                                |                             |
| <i>Corallorhiza trifida</i>                           | Racine de corail                 | L-                                 | VU                    | NT                 | < 1%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Cypripedium calceolus</i>                          | Sabot de Vénus                   | L-                                 | VU                    | VU                 | 4-8%                                  |                             |
| <i>Dactylorhiza alpestris</i>                         | Orchis alpestre                  | -                                  | DD                    | DD                 | ?                                     |                             |
| <i>Dactylorhiza elata</i>                             | Orchis élevé                     | N-                                 | LC                    | VU                 | 1-4%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i>                           | Orchid de Fuchs                  | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  |                             |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> | Orchis incarnat                  | L-                                 | VU                    | VU                 | < 1%                                  |                             |
| <i>Dactylorhiza maculata</i>                          | Orchis tacheté                   | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                | régionale (LR)              |
| <i>Dactylorhiza majalis</i>                           | Orchis à larges feuilles         | L-                                 | NT                    | NT                 | 0,2-2%                                |                             |
| <i>Dactylorhiza occitanica</i>                        | Orchis d'Occitanie               | L+                                 | VU                    | VU                 | 100%                                  |                             |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i>                         | Orchis sureau                    | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-1%                                | régionale (LR)              |
| <i>Epipactis atrorubens</i>                           | Epipactis pourpre noirâtre       | N-                                 | LC                    | LC                 | < 0,1%                                |                             |
| <i>Epipactis distans</i>                              | Epipactis à feuilles écartées    | N-                                 | LC                    | LC                 | < 1%                                  |                             |
| <i>Epipactis exilis</i>                               | Epipactis gracile                | L+                                 | EN                    | DD                 | ?                                     | régionale (LR)              |
| <i>Epipactis fageticola</i>                           | Epipactis des hêtraies           | ?                                  | ?                     | NT                 | ?                                     |                             |
| <i>Epipactis helleborine</i>                          | Epipactis à larges feuilles      | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Epipactis leptochila</i>                           | Epipactis à labelle étroit       | -                                  | DD                    | LC                 | << 1%                                 | régionale (LR)              |
| <i>Epipactis microphylla</i>                          | Epipactis à petites feuilles     | N+                                 | LC                    | LC                 | 1,5-10%                               |                             |
| <i>Epipactis muelleri</i>                             | Epipactis de Müller              | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Epipactis palustris</i>                            | Epipactis des marais             | L-                                 | NT                    | NT                 | 0,1-2%                                | Aveyron                     |
| <i>Epipactis purpurata</i>                            | Epipactis violacé                | L-                                 | VU                    | LC                 | < 1%                                  |                             |
| <i>Epipactis rhodanensis</i>                          | Epipactis du Rhône               | L+ ?                               | VU                    | NT                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Epipactis tremolsii</i>                            | Epipactis de Tremols             | -                                  | DD                    | LC                 | << 1%                                 | Aveyron                     |
| <i>Epipogon aphyllum</i>                              | Epipogon sans feuilles           | L-                                 | EN                    | NT                 | << 1%                                 |                             |
| <i>Goodyera repens</i>                                | Goodyère rampante                | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Gymnadenia austriaca</i> var. <i>iberica</i>       | Nigritelle d'Autriche            | L-                                 | VU                    | LC                 | << 1%                                 | Aveyron                     |
| <i>Gymnadenia conopsea</i>                            | Orchis moucheron                 | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-1%                                |                             |
| <i>Gymnadenia odoratissima</i>                        | Orchis odorant                   | -                                  | EN                    | VU                 | << 1%                                 |                             |
| <i>Gymnadenia pyrenaica</i>                           | Orchis des Pyrénées              | -                                  | DD                    | DD                 | << 1%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Hammarbya paludosa</i>                             | Malaxis des marais               | L+                                 | CR                    | EN                 | < 10 %                                |                             |
| <i>Himantoglossum hircinum</i>                        | Orchis bouc                      | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Himantoglossum robertianum</i>                     | Orchis géant                     | N+                                 | LC                    | LC                 | 2-15%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Limodorum abortivum</i>                            | Limodore à feuilles avortées     | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  |                             |
| <i>Listera cordata</i>                                | Listère en coeur                 | L-                                 | NT                    | LC                 | 0,5-1,5%                              |                             |
| <i>Listera ovata</i>                                  | Listère ovale                    | N-                                 | LC                    | LC                 | < 1%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Neotinea lactea</i>                                | Orchis couleur de lait           | L-                                 | NT                    | VU                 | 3-10%                                 |                             |
| <i>Neotinea maculata</i>                              | Orchis intact                    | N+                                 | VU                    | LC                 | 3-10%                                 |                             |
| <i>Neotinea tridentata</i>                            | Orchis tridenté                  | L-                                 | EN                    | NT                 | <<1%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Neotinea ustulata</i>                              | Orchis brûlé                     | N-                                 | LC                    | LC                 | < 1%                                  |                             |
| <i>Neottia nidus-avis</i>                             | Néottie nid d'oiseau             | N-                                 | LC                    | LC                 | < 1%                                  |                             |
| <i>Ophrys apifera</i>                                 | Ophrys abeille                   | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,5-2%                                | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys arachnitiformis</i>                         | Ophrys en forme d'araignée       | N+                                 | LC                    | LC                 | 0,5-5%                                |                             |
| <i>Ophrys araneola</i>                                | Ophrys petite araignée           | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,5-5%                                |                             |
| <i>Ophrys aranifera</i>                               | Ophrys araignée                  | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys aveyronensis</i>                            | Ophrys de l'Aveyron              | L+                                 | EN                    | EN                 | 100%                                  |                             |
| <i>Ophrys aymoninii</i>                               | Ophrys d'Aymonin                 | L+                                 | VU                    | VU                 | 99%                                   |                             |
| <i>Ophrys bertolonii</i> sensu lato                   | Ophrys de Bertoloni              | N+                                 | VU                    | NT                 | 0,4-2%                                | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys bilunulata</i>                              | Ophrys à deux lunules            | N+                                 | LC                    | DD                 | 4-15%                                 |                             |
| <i>Ophrys bombyliflora</i>                            | Ophrys bombyx                    | CC                                 | NA                    | NT                 | << 1%                                 |                             |
| <i>Ophrys catalaunica</i>                             | Ophrys de Catalogne              | CC                                 | NA                    | NT                 | << 1%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys corbariensis</i>                            | Ophrys des Corbières             | L+                                 | VU                    | DD                 | < 10%                                 |                             |
| <i>Ophrys incubacea</i>                               | Ophrys noir                      | L-                                 | VU                    | LC                 | 0,3-5%                                |                             |
| <i>Ophrys insectifera</i>                             | Ophrys mouche                    | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-1%                                | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys lupercalis</i>                              | Ophrys des lupercals             | N-                                 | LC                    | LC                 | 2-10%                                 |                             |
| <i>Ophrys lutea</i>                                   | Ophrys jaune                     | N-                                 | LC                    | LC                 | 4-20%                                 |                             |
| <i>Ophrys massiliensis</i>                            | Ophrys de Marseille              | N+                                 | LC                    | LC                 | 5-20%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys passionis</i>                               | Ophrys de la passion             | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-10%                                 |                             |
| <i>Ophrys provincialis</i>                            | Ophrys de Provence               | -                                  | DD                    | DD                 | << 1%                                 |                             |
| <i>Ophrys pseudoscolopax</i>                          | Ophrys fausse bécasse            | N-                                 | LC                    | DD                 | ?                                     | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys santonica</i>                               | Ophrys de Saintonge              | L-                                 | VU                    | DD                 | 8-20%                                 |                             |
| <i>Ophrys scolopax</i>                                | Ophrys bécasse                   | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  |                             |
| <i>Ophrys speculum</i>                                | Ophrys miroir                    | CC                                 | NA                    | VU                 | << 1%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Ophrys splendida</i>                               | Ophrys brillant                  | N+ ?                               | LC ?                  | NT                 | 10-30%                                |                             |
| <i>Ophrys sulcata</i>                                 | Ophrys sillonné                  | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,4-4%                                |                             |
| <i>Ophrys virescens</i>                               | Ophrys verdissant                | N-                                 | LC                    | DD                 | ?                                     | régionale (MP)              |
| <i>Orchis anthropophora</i>                           | Orchis homme-pendu               | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Orchis mascula</i>                                 | Orchis mâle                      | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,1-2%                                |                             |
| <i>Orchis militaris</i>                               | Orchis militaire                 | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-5%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Orchis olbiensis</i>                               | Orchis d'Hyères                  | -                                  | DD                    | NT                 | 1-5%                                  |                             |
| <i>Orchis provincialis</i>                            | Orchis de Provence               | N-                                 | LC                    | LC                 | 8-30%                                 |                             |
| <i>Orchis purpurea</i>                                | Orchis pourpre                   | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-3%                                  | régionale (MP)              |
| <i>Orchis simia</i>                                   | Orchis singe                     | N-                                 | LC                    | LC                 | 2-7%                                  |                             |
| <i>Platanthera bifolia</i>                            | Orchis à deux feuilles           | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-4%                                  |                             |
| <i>Platanthera chlorantha</i>                         | Platanthère de montagne          | N-                                 | LC                    | LC                 | 0,5-2%                                | régionale (MP)              |
| <i>Pseudorchis albida</i>                             | Orchis blanc                     | L-                                 | EN                    | LC                 | << 1%                                 |                             |
| <i>Serapias lingua</i>                                | Sérapias en langue               | N-                                 | LC                    | NT                 | 0,5-3%                                | régionale (MP)              |
| <i>Serapias parviflora</i>                            | Sérapias à petites fleurs        | L-                                 | EN                    | NT                 | 1-10%                                 |                             |
| <i>Serapias vomeracea</i>                             | Sérapias à labelle allongé       | N-                                 | LC                    | LC                 | 1-3%                                  |                             |
| <i>Spiranthes aestivalis</i>                          | Spiranthe d'été                  | L+                                 | VU                    | VU                 | 3-25%                                 | régionale (MP)              |
| <i>Spiranthes spiralis</i>                            | Spiranthe d'automne              | N+                                 | LC                    | NT                 | 0,3-3%                                |                             |

MP = Midi-Pyrénées LR = Languedoc-Roussillon

## Classes de responsabilité régionale

L+ : taxon régionalement menacé et d'importance nationale ou globale  
L- : taxon régionalement menacé mais de moindre importance nationale  
N+ : taxon régionalement non menacé et d'importance nationale ou globale  
N- : taxon régionalement non menacé et de moindre importance nationale  
CC : taxon à enjeu régional face aux changements climatiques

## Catégories de la liste rouge

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| RE | Taxon régionalement éteint      |
| CR | En danger critique d'extinction |
| EN | En danger d'extinction          |
| VU | Vulnérable                      |
| NT | Quasi menacé                    |
| LC | Préoccupation mineure           |
| DD | Données insuffisantes           |
| NA | Non applicable                  |